



Lézard à collier (*Crotaphytus collaris*)

F. Crotaphytidae

Origine: Continent américain: milieu subdésertiques et montagneux d'Amérique du Nord (Arizona, Nevada, Texas, Mexique).

Dangerosité: non venimeux

Description et hébergement: De taille modeste (25-30 cm, 350-400g), ce lézard terrestre, diurne, semi-arboricole et fouisseur est docile et facile à manipuler. Les conditions d'entretien sont classiques. Les mâles sont plus colorés, parsemés de taches bleues sur fond gris-brun. Deux colliers noirs autour du cou lui valent son nom. Curieux et actif, il est intéressant à observer. Attention aux griffes et aux morsures tenaces. Convient cependant à un débutant. Adulte à 3 ans environ. Le terrarium de type tropical sec est relativement vaste malgré la petite taille de l'animal: L 150cm x l 100cm x h 80cm. Préférer une ouverture frontale. Cet animal fouisseur appréciera un substrat composé de copeaux de hêtre ou de sable pour reptiles désertiques. Aménager une cachette et disposer plusieurs branches basses ou des écorces de bois creux. Un empilement de roches ou d'écorces de liège sera apprécié. Un tube à rayonnements ultraviolets est indispensable. Pour éviter qu'il ne prenne froid, le transport se fera dans une chaussette et l'animal sera conservé directement contre le corps du propriétaire.

Ambiance: Température diurne: 30-35 C, avec un point chaud à 37-40 C et un point froid à 26-28 C. La nuit: 21-25 C. Hygrométrie faible (40%), obtenue par une cuvette d'eau tiède occasionnelle, placée au point chaud. Le substrat doit rester sec. Eclairage: 10-12 heures par jour en hiver et 14 heures par jour en été. Penser à installer un tube ultraviolet.

Alimentation: Essentiellement insectivores (70%: criquets, grillons saupoudrés de CaCO₃ une fois par semaine), ils consomment également des protéines animales (20% - souris de 3-4 jours) et des végétaux et fruits (10%: endives, salade romaine, morceaux d'orange et de mangue). Les adultes délaissent fréquemment les végétaux. Les croquettes pour iguanes et agames ne sont pas adaptées, sauf ponctuellement. L'appétit baisse avant la période hivernale. Les rongeurs seront distribués fraîchement tués et de taille adaptée au lézard: une fois par semaine pour les juvéniles, toutes les 2-3 semaines aux adultes. Distribuer un complément calcique: journalier chez les jeunes, hebdomadaire pour les adultes. Les repas sont quotidiens chez les jeunes, tous les 2-3 jours pour les adultes. Lorsqu'ils sont importés adultes, les lézards à collier ne sont pas habitués à boire dans une coupelle: pulvériser de l'eau tiède dans l'aquarium tous les deux jours.

Divers: GB: 'Collared lizard'. Longévité: 10 ans environ. La plupart des animaux proposés à la vente sont prélevés dans la nature. Les congénères ne sont pas acceptés: un grand terrarium permettra d'héberger un couple au maximum. Séparer les jeunes précocément (morsures, cannibalisme). Laisser hiberner les animaux en bonne santé et d'un poids suffisant, entre décembre et février. Ne pas faire hiberner les animaux faibles ou trop maigres.

Pathologie: Robustes, ils craignent cependant une température insuffisante et le manque de lumière. Brûlures, morsures, traumatismes, fractures lors d'ostéodystrophie, syndrome de maladaptation des sujets importés adultes (anorexie), parasitisme intestinal, gastro-entérite bactérienne. Dermatite (ampoules) en cas d'hygrométrie trop élevée. Difficultés de mue en atmosphère trop sèche. Pneumonie lors d'hygrométrie trop importante.

Autres sites: consulter www.PORTAIL-VETERINAIRE.com