

## Tortues terrestres -généralités-

### Origine:

### Dangerosité:

**Description et hébergement:** Il existe plus de 250 espèces de tortues ! Les tortues terrestres grandissent plus vite en captivité que dans le milieu naturel. Elles ont atteint le tiers de leur taille adulte à 3 ans et les deux tiers à 6 ans. Elles sont actives le jour.

**Ambiance:** Température: 20-28 C (jour), 15-23 C (nuit). Hygrométrie: 30-70%.

**Alimentation:** Les tortues terrestres doivent s'alimenter chaque jour. Le jeûne ne peut dépasser un jour par semaine. Les adultes sont principalement herbivores, les jeunes ont besoin d'un apport carné plus important. En liberté: feuilles, herbe, fruits, racines. En captivité: salade (laitue), légumes (chou découpé), racines (carottes rapées), bourgeons, fruits (banane, kiwi, pomme en tranches, groseilles, fraises, tomate), pain brun, céréales arrosées de lait, trèfle, herbe, pissenlit, plantain, viande maigre crue hâchée, nourriture pour chiens et chats. Complémenter en calcium et vitamines. Pour les jeunes: ajouter de la viande hâchée (crue), escargots, vers de terre. Les aliments de couleur jaune semblent stimuler l'appétit. Une journée de jeûne par semaine est possible. Les tortues s'alimentent le jour. L'eau de conduite convient parfaitement. Les tortues profitent des bains pour s'hydrater: deux fois par semaine pendant 20 minutes dans 1-2 cm d'eau à 32 degrés C.

**Divers:** La longévité s'étend de 50 à 200 ans (tortues éléphantines). Les femelles sont en général plus grandes que les mâles. La queue est plus longue et plus forte chez le mâle. Maturité sexuelle: 6-7 ans, 10-13 ans (tortue d'Hermann), 13-14 ans (tortue grecque). Ovipare.

**Pathologie:** A l'achat, les tortues terrestres doivent paraître denses lorsque vous les soupesez. Une astuce pour apprécier la vitalité de l'animal: poser l'avant sur un objet stable de la taille d'une grosse boîte d'allumettes l'incite à y grimper rapidement. Une alimentation trop riche en phosphore ou carencée en calcium peut occasionner une ostéofibrose (carapace irrégulière, molle etc). Une carence en vit A favorise une conjonctivite bilatérale.

**Autres sites:** consulter [www.PORTAIL-VETERINAIRE.com](http://www.PORTAIL-VETERINAIRE.com)