Dr Vét O. SASSOT

ECUREUIL DE CORÉE (Tamia striatus)

O. Rongeurs S.O. Sciurognathes F. Sciuridés G. Tamia E. striatus

Longévité: Longévité: 8-12 ans (5 ans).

Description: L'écureuil de Corée a un dos gris avec cinq raies longitudinales brun foncé; les flancs sont gris-jaunâtre • Poids: 50-120g • Longueur du corps: 15cm • Queue: 10-12cm • Formule dentaire (mâchoire supérieure/inférieure): incisives (1/1), canines (0/0), prémolaires (2/1), molaires (3/3) pour un total de 22 dents à pousse continue • Température: 38-39,5°C • Coeur: 200-500/min • Respiration: 300-500/min • Sang: 8ml/100g PV • L'animal et muni de poches jugales (abajoues) • 4 doigts aux membres antérieurs, 5 doigts aux membres postérieurs.

Habitat: * Dans les conditions naturelles, il vit dans un terrier individuel muni d'une chambre centrale et de couloirs annexes servant de garde-manger pendant l'hiver. L'écureuil de Corée hiberne d'octobre à avril (il n'hiberne pas lorsqu'il est hébergé à l'intérieur).
* En captivité, la cage doit avoir pour dimensions minimales: L 100cm x P 50cm x h 150cm. L'ensemble ressemble à une vaste volière d'intérieur grillagée, munie de montants métalliques. Les mailles ne doivent pas dépasser 2cm. Disposer une ou plusieurs grosses branches, un nid en bois (15cm x 15cm x 15cm) dont l'orifice d'entrée aura un diamètre de 3cm. La litière sera composée de tourbe ou de foin d'excellente qualité. Il faudra la changer avant que l'urine ne dégage une odeur désagréable. L'animal en lui-même ne dégage pas d'odeur. Température ambiante: pas d'exigence particulière. Veiller à assurer une excellente ventilation sans acun courant d'air. Il est même possible de l'héberger à l'extérieur en évitant une exposition plein sud. Il n'apprécie pas les écarts de température importants.

Alimentation: * A l'état sauvage, il se nourrit de baies, insectes, grenouilles, petits reptiles, oeufs et oisillons. * En captivité, il existe des aliments industriels spécifiques. Une préparation ménagère convient également: graines variées (noix, noisettes, frêne, maïs, blé, tournesol), flocons d'avoine, gâteaux secs, pain trempé dans du lait sucré, salade, pissenlits, écorces fraîches, fruits (cerises, pommes), bourgeons. En petite quantité, on distribuera également: oeuf, viande crue, vers de farine, insectes.

Comportement: Contention - l'animal se déplace rapidement et mord facilement. Ne jamais saisir l'extrêmité de la queue, qui risque de vous rester dans la main ("fur slip")... On peut utiliser un cylindre de verre ou un filet à papillon. Plus couramment, on utilise un gant et on saisit l'animal par la tête prise entre le pouce et l'index.

Reproduction: Une seule saison annuelle, en mars-avril. Maturité sexuelle: femelle (11 mois), mâle (12 mois). On recommande d'attendre 1 an • Durée de reproduction: 5-6 ans • Cycle: 4-5 jours • Ovulation: spontanée • Un seul accouplement au 2ème jour du cycle • Gestation: 30-44 jours • Portées: 3-6 / an • Prolificité: 3-5 / portée • Poids à la naissance: 3-4 grammes • Allaitement: 4-8 sem • Mamelles: 4 paires •

Autres sites: consulter www.PORTAIL-VETERINAIRE.com