



HAMSTER de SYRIE (= hamster doré) *Mesocricetus auratus*

Cl Mammifères O. Rongeurs S.O. Myomorphes F. Muridés S.F. Cricétinés *Mesocricetus auratus*

Longévité: Longévité: 2-3 (max 4).

Description: Formule dentaire (machoires sup/inf): incisives (1/1), canines (0/0), prémolaires (0/0), molaires (3/3). Les incisives poussent continuellement. Les jeunes ont d'emblée la dentition définitive (pas de dents de lait) • Poids: 85-150 g (mâle < femelle; attention à l'embonpoint) • Longueur: 15-20 cm • Queue: 1,2 cm • Température: 37-38°C • Coeur: 200-500/min • Respiration: 100-150/min • Sang: 8ml/100g PV. • Pelage: une zone dépilée bilatérale sur les flancs est physiologique. Trois variétés (combinaisons possibles): court, long ('teddy'), satiné. De nombreuses variétés de couleurs • 4 doigts aux membres antérieurs, 5 doigts aux membres postérieurs.

Habitat: Cage métallique > L 50cm x P 30 cm x h 30 cm. Barreaux horizontaux. Disposer des barreaux intermédiaires en bois ou en plastique à l'intérieur de la cage pour qu'il grimpe. Placer un abri. Ajouter des accessoires fixés (roue, échelle, galeries, branchages etc). Abreuver au biberon fixe. Fond de cage plein, amovible, d'entretien aisé. Litière: sciure de bois, copeaux de sapin ou papier. Renouveler 1-2 fois par semaine. Eviter: bois de cèdre (odorant, troubles de la reproduction), tourbe (moisissures). Température ambiante: 21-25°C. Ventilation: 10-15x /heure. Vitesse air: 0,30 m/seconde. Eclairage: 30-40 watts/m² (lux) douze heures par jour. Hygrométrie: 30-70%. Amoniaque: < 8 ppm.

Alimentation: Omnivore: légumes, fruits, pain, fromage, viande, lait, graines, vitamines A D E PP. Branchages (usure des incisives). Transporte les aliments dans ses abajoues (1 cm de large; 3,5cm de long) qu'il vide à l'aide des pattes avant et de la langue. Retirer régulièrement les réserves de nourriture constituées dans les recoins de la cage. Consomme: 10-12 g/100g PV/jour + eau: 8-10 ml/100g PV/jour. Des mélanges ou des granulés industriels spécifiques sont disponibles (16% protéines). Exemple de rationnement ménager: graines pour cobaye (70%) + graines pour perruches ondulées (20%) + graines pour canaris (10%) + flocons et biscuits pour chiens + flocons d'avoine et pain dur sec + légumes (salade, pissenlit, carotte, chou), fruits (pomme, poire) + lait, oeuf dur, viande, vers de farine... Pour éviter l'embonpoint, ne pas distribuer la nourriture à volonté. Ne jamais distribuer de chocolat, qui colmate les abajoues.

Comportement: Doux et familier s'il est manipulé régulièrement. Pour attraper les individus peu familiers ou agressif, utiliser une serviette en tissu éponge. Eviter de pincer la peau du cou sans nécessité. Activité nocturne (ne pas les déranger dans la journée). Solitaire: mâles et femelles vivent dans des terriers séparés. Dans les conditions naturelles: profonds terriers + réserve de nourriture parfois considérables (50-100 kg...). Les adultes sont agressifs entre eux. Hibernation: de novembre à mars (température corporelle passe de 32°C à 4°C), entrecoupée de réveils hebdomadaires pour se nourrir et déféquer. En captivité: préfère vivre seul. Séparer les adultes. Seuls les jeunes d'une même portée ou du même âge peuvent rester ensemble. A la rigueur, on peut laisser des mâles ensemble... Les hamsters nain (cf infra) ont meilleur caractère! Contention: prendre la peine de réveiller le hamster au préalable... S'il est coopératif, le placer sur le plat de la main, maintenu entre le pouce et l'index de l'autre main. On peut aussi saisir l'avant-main d'une main. Eviter la peau du cou. Les sujets agressifs seront tenus à l'aide d'une serviette ou contenus dans une boîte de conserve adaptée. Attention aux chutes de la table d'examen!

Reproduction: Se reproduit d'avril à août • Maturité sexuelle - Femelle: 6-10 sem. Mâle: 10-14 sem. On recommande d'attendre 2 mois • Durée de reproduction: 1-1,3 ans • Cycle: 4-5 jours • Oestrus: 12-20 heures (l'oestrus post-partum est infertile) • Ovulation: spontanée, la nuit • Gestation: 15-21 (16) jours • Pseudogestation: parfois rencontrée après un accouplement non fécond. Dure 9-10 jours • Portées: 2-10 / an • Prolificté: 5-12 / portée • Poids à la naissance: 1,5-3 grammes • Allaitement: 20-28j (orphelins: lait pour chiots ou chatons) • Mamelles: 7-11 paires. Le cannibalisme est fréquent lorsque la femelle est dérangée dans les 10 premiers jours. Les petits ouvrent les paupières au 15ème jour.

Autres sites: consulter www.PORTAIL-VETERINAIRE.com