



LAPIN DOMESTIQUE / LAPIN NAIN (*Oryctolagus cuniculus*)

O. Lagomorphes F. Léporidés g. *Oryctolagus* esp. *Cuniculus*

Longévité: Longévité: moy: 5-8 ans, max: 15 ans

Description: Formule dentaire (mâchoire supérieure/inférieure): incisives (2/1), canines (0/0), prémolaires (3/2), molaires (3/3) pour un total de 28 dents • Poids: 2-6 kg (femelle > mâle). Nains: 1-1,5kg • Température: 38-39,5°C • Coeur: 130-325/min. Nain: 160-300/min • Respiration: 20-60/min • Sang: 60 ml • Nombreuses races de taille et de livrée très variées.

Habitat: Une cage grillagée (L 1m x P 0,5m x h 0,5m) conviendra à 1 ou 2 lapins nains. Elle sera placée dans une pièce sans courant d'air (10 renouvellements d'air par heure; 0,1 m/s en hiver; 0,4 m/s en été) à 15-22°C, sous 40-60% humidité. Eviter le soleil direct et les radiateurs trop proches. Le fond de la cage doit être équipée d'un bac à bords hauts (16-25 cm), amovible et en plastique, surmonté d'une grille qui servira de plancher. A défaut, un bac à litière pour chat pourra être disposé dans un coin de la cage. La litière sera composée d'une sous-couche (2 cm) de copeaux de bois blanc ou de litière pour chat en sépiolite (= argile). Une couche de paille ou de foin recouvre l'ensemble. Des granulés de végétaux compactés se révèlent également pratiques (en l'absence de grille, ils pourront éventuellement être ingérés). L'ensemble est renouvelé 1-2 fois par semaine. Un abri (L35cm x l25cm x h20cm) remplacera le terrier. En été, un enclos extérieur peut être aménagé, à l'abri du soleil direct, équipé d'une sorte de cabane en guise de terrier, protégé des chiens et autres prédateurs, dont le lapin ne doit pas pouvoir sortir ni par dessus, ni par dessous. Des plats lourds en grès vernissé ou faïence serviront de mangeoire; leur stabilité est indispensable. Un biberon distributeur d'eau (200-450 ml) complètera l'équipement. L'éclairage naturel ou artificiel (30-40 lux = watts/m²) 12-14 heures par jour convient. Pour finir, laissez grignoter des branches de noisetier, charme, aulne, saule, tilleul, érable, frêne, arbres fruitiers, genêt, vigne ou des planches d'épicéa, tilleul.

Alimentation: Consomme 30-50 g/kg/j + eau 50-200 ml/j (changée chaque jour). Granulés et flocons spéciaux pour lapins (prot 16-17%, mat grasses 3-4%, cellulose 12-14%, minéraux 8-9%, Ca/P 1,25) représentent au moins 85% de la ration quotidienne (proscrire les mélanges pour rongeurs) + 15% au maximum de verdure fraîche [salade, mâche, chicorée, bulbe de céleri, brocoli, feuilles et tubercule de fenouil, feuilles de radis blanc, parti verte du soja, topinambour, feuilles et tiges de pois, rutabagas, betterave potagère ou fourragère, tournesol, jeunes épis de maïs frais, grains de blé, d'avoine, d'orge et de maïs concassés, quartier de pomme, fraises, carottes, fanes de carottes, endives, pissenlit, plantain lancéolé, achillée, grande cousoude, armoise, épinards sauvages, arroche, trèfle jaune, luzerne, orties jaunes, vesce, berce, tussilage, camomille, cresson, séneçon, bruyère, genêt, ajonc, persil, sauge, absinthe, cumin, bourrache, aneth, livèche, senevé, thym, cerfeuil (sauf aux mères allaitantes) etc]. Le foin (regain des alpages, herbe, luzerne et légumineuses) est laissé à disposition. Eviter la surconsommation et l'embonpoint. Les granulés complets évitent le tri sélectif. Une fois par semaine, distribuez un morceau de pain dur ou une galette suédoise. Ecartez définitivement les présentations à ronger vendues dans le commerce, consistant en un agglomérat de graines grasses collées par le sucre. Ne pas donner: pomme de terre, feuilles de choux-fleurs, choux, oignons, marrons, glands, persil (troubles génitaux chez femelle), graines oléagineuses, haricots crus, chocolat, biscuits, gâteaux, feuilles de chêne, laurier rose, if, tremble, troène, peuplier, bouton d'or, digitale, colchique, coquelicot, plantes d'intérieur etc. Avec modération: noix, noisettes, amandes, friandises, biscuits etc. Tout changement alimentaire doit être effectué au moyen d'une transition de quelques jours, au risque d'un refus complet. Plafonner l'apport de luzerne à 40% de la ration quotidienne (trop riche en calcium, risque de lithiase urinaire).

Comportement: Vit le jour. Calme et craintif. S'approprie facilement. Il peut vivre seul, en bande ou cohabiter avec d'autres animaux (cobaye). Les jeunes femelles peuvent également cohabiter. Mais une agressivité risque d'apparaître à la période des chaleurs ou du fait de la lapine dominante. Les lapines allaitantes se montrent également très agressives vis-à-vis des intrus. Il faudra donc prévoir de les séparer en cas de conflit. Le lapin doit rester toute la journée dans sa cage afin de ne pas dégrader le mobilier et ne pas se blesser (fils électriques). Mais on pourra le laisser un peu vagabonder en-dehors de la cage, en la présence des maîtres. L'excès de bruit et l'agitation sont préjudiciables au lapin (téléviseur, téléphone, cris, jeux d'enfants etc). Le lapin ingère certaines de ses crottes molles (caecotrophie) émises la nuit et récupère ainsi des vitamines B indispensables. Peut se dresser jeune à faire ses besoins toujours au même endroit. Contention: avec fermeté. Eviter la peau du dos chez les animaux lourds: soutenir les postérieurs. Ne pas l'attraper par les oreilles. Marquage du territoire: frottements du chanfrein et du menton sur les meubles.

Reproduction: * Lapin domestique - Reproduction: toute l'année. Les testicules remontent en position abdominale • Cycle: 16-17 jours • L'ovulation est provoquée par l'accouplement (à la différence des rongeurs) • Maturité sexuelle: les petites races sont plus précoces. Femelle: 4-8 mois. Mâle: 5-7 mois. On recommande d'attendre 8 mois • Durée de reproduction: 5-6 ans. Femelle: 2-3 ans • Gestation: 28-35 jours • Pseudogestation: fréquente (15-19 jours) • Portées: 2-4 par an • Prolificité: 2-10 / portée • Poids à la naissance: 30-200 grammes • Allaitement: 28-42j • Mamelles: 4 paires • Avant la mise bas (3-7j), la femelle prépare un nid, arrache des poils autour des mamelles. Les petits naissent aveugles et nus. Retirer le mâle avant l'accouchement. Il ne faut pas déranger la mère jusqu'au sevrage. • Allaitement artificiel : utiliser du lait maternisé pour chiots et chatons, moins dilué que pour ces derniers. Administrer une seule fois par jour, à concurrence de 20% maxi du poids du lapereau. Alimentation: 40-50 g/kg/j + eau 200-500 ml/j. Foin, herbe coupée. Jusqu'à 10 lapereaux par portée.

* Lapin nain - Puberté: 4-7 mois • Cycle: 12-14 j • Gestation: 30-32 j • Portées: 3-4 / an • Prolificité: 2-5 / portée • Allaitement: 3-4 sem • La température au nid doit être de 29-30°C (jamais inférieure à 25°C). Les petits sortent du nid à 3 semaines et commencent alors à manger foin et autres nourritures. Attendre l'âge de trois mois pour donner de la verdure, en quantité raisonnable. L'allaitement artificiel des lapereaux orphelins se fera avec du lait maternisé pour carnivores, disponible chez votre vétérinaire. Une seule tétée par jour peut suffire (le matin). Le sevrage sera un peu anticipé (25° jour).

Autres sites: consulter www.PORTAIL-VETERINAIRE.com